



الرقم: ٧٤/٧/٥٥
التاريخ: ١٧/٦/٢٠١٧

عطوفة نقيب الأطباء
الدكتور نظام نجيب المحترم

بعد التحية ،،،

الموضوع : مأمونية استخدام دواء Dipyron عند الاطفال

مرفق طيه كتاب مدير دائرة المعلومات الصيدلانية بخصوص الموضوع المذكور اعلاه .

يرجى التعميم على الزميلات والزملاء الأطباء الكرام بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بترشيد استخدام دواء تسكين الالام وخافض الحرارة المعروف بالدايبرون Dipyron او الميتاميزول Metamizole وذلك تجنباً لحدوث اي اعراض جانبية قد تؤثر سلباً على سلامة المرضى وخاصة الاطفال ، علماً بان الدواء غير مدرج في قائمة الأدوية الأساسية لوزارة الصحة .

واقبلوا الاحترام ،،،

د. رانية شاهين
مدير عام الصيدلة



نسخة / معالي وزير الصحة حفظه الله
/ عطوفة وكيل وزارة الصحة المحترم
مدير دائرة المعلومات الصيدلانية المحترم
مدير دائرة التسجيل الدوائي المحترم



التاريخ : 5-3-2017م

حضرة مدير عام الصيدلة المحترمة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : مأمونية استخدام دواء Dipyron عند الاطفال

نرجو من حضرتكم التعميم على مقدمي الرعاية الصحية من اطباء وصيادلة بضرورة الالتزام بالتعليمات التالية الخاصة بترشيح استخدام دواء تسكين الالام وخفض الحرارة المعروف بالدايبرون Dipyron او الميثاميزول Metamizole وذلك تجنباً لحدوث اي اعراض جانبية قد تؤثر سلباً على سلامة المرضى وخاصة الاطفال :

- يجب ان يستخدم الدواء لتخفيف الأوجاع القوية ولخفض الحرارة والتي لم تنجح معها اي ادوية مسكنة اخرى لان استخدامه ارتبط باعراض جانبية قد تكون نادرة ولكن ان حدثت تكون خطيرة مثل فرط الحساسية أو نقص خلايا الدم البيضاء ، ويمنع استعمال الدواء لتخفيف الأوجاع البسيطة.
- اعراض الاصابة بنقص خلايا الدم البيضاء هي : حرارة عالية، قشعريرة، ألم في الحنجرة، صعوبة في البلع، التهابات في تجويف الفم، والأنف ، وشعور بالاجهاد والضعف العام . وعند ظهور أحد هذه الأعراض او اي اعراض جانبية اخرى للدواء مثل طفح جلدي، اختناق ، انتفاخ وتورم بالعين والوجه والمفاصل ،عندها يجب التوقف فوراً عن أخذ الدواء ومراجعة الطبيب.
- يجب العلم ان احتمال حدوث اعراض جانبية للدواء مثل الحساسية المفرطة و نقص خلايا الدم البيضاء Agranulocytosis تزداد اذا استمر العلاج بالدواء لمدة أكثر من أسبوع .
- اذا استعمل الدواء واستمرت السخونة أكثر من ثلاثة أيام أو استمرت الالام لفترة تزيد عن عشرة ايام دون اي تحسن فعندها يجب مراجعة الطبيب.
- يجب ان يكون اخذ الدواء بفترات زمنية لا تقل عن 6-8 ساعات .
- توصي ان يتم حساب جرعة الدواء للأطفال حسب وزن الطفل .
- لا يوصى بإعطاء الدواء للأطفال دون الثلاثة أشهر من العمر أو من وزنهم أقل من خمسة كغم .
- الأقراص ليست مخصصة للأطفال دون 15 سنة ويمكن إعطاء هذا الدواء لهم على شكل نقاط.
- في حال حدوث اي آثار جانبية للدواء لدى المريض يجب ابلاغ دائرة المعلومات الصيدلانية / الادارة العامة للصيدلة.

واقبلوا فائق الاحترام ...

مدير دائرة المعلومات الصيدلانية

د. نهالي فتوح

